1 de Diciembre, Día Mundial del Sida

El Sida hoy: Informe Especial

Según los últimos datos aportados por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-sida (ONUSIDA), en 2010 vivían en el mundo 34 millones de personas con VIH. Como resultado del aumento en el acceso a los tratamientos la tasa de nuevas infecciones se redujo un 21% con respecto a 1997.

Latinoamérica

La presencia del virus del VHI en Latinoamérica hoy en día tiene una barrera que, poco a poco, contiene en parte su avance, esta región es la que tiene mayor tasa de cobertura del tratamiento antirretrovírico 64%. En consecuencia, la mortalidad por SIDA ha disminuido: 67 000 en 2010, en comparación con el máximo de 83 000 en 2001–2003.

No cabe duda que hay mucho trabajo por realizar en materia preventiva, ya que el contagio persona a persona sigue presente en el mundo, el VIH afecta principalmente a la población joven de nuestros países. La educación juego un papel primordial

La Organización Mundial de la Salud explica que en América Latina, el VIH se está propagando fundamentalmente a través de redes de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Muchos de esos hombres también tienen relaciones sexuales con mujeres, a menudo debido a la estigmatización social de las relaciones homosexuales. Por ejemplo, en el estudio realizado en 2010 en Nicaragua, el 40% de los hombres de

Managua y el 57% de los de Chinandega que tenían relaciones sexuales con hombres decían haber tenido relaciones sexuales también con mujeres en el año anterior.

Esta región es la que tiene mayor tasa de cobertura del tratamiento antirretrovírico: El 44% de los menores de 15 años que necesitaban tratamiento contra el VIH tuvieron acceso a él en 2010. Sin embargo, es cada vez es más claro generar conciencia en el enfoque PREVENTIVO EDUCACIONAL que los países deben adoptar, siempre es mejor prevenir que curar

Argentina y Brasil fueron los primeros países Latinoamericanos en brindar tratamiento retroviral a la población. Desde 1996 nuestro país dispone de esta terapia través del PROGRAMA Sida para el sistema público y las obras sociales. Este hecho marcó un antes y un después en la evolución de esta epidemia en Argentina y en el mundo.

Recientes estimaciones en Argentina indican 130 mil personas infectadas con el virus del VIH. La mitad de ellos conoce su condición y la mayoría se encuentra en seguimiento en los servicios de salud.

Gran parte de los casos están presentes en grandes conglomerados urbanos. El 70 % corresponden al centro del país, de esos casi el 60% corresponde a Capital Federal y Gran Buenos Aires, siguen en número las grandes ciudades como Santa Fe y Córdoba.

¿Cuándo se habla de presencia de SIDA?

Según Adriana Durán, experta en VIH-Sida, investigadora clínica y epidemióloga del Ministerio de Salud de Argentina, “entre el año 1991 y el 2001 era notificación obligatoria

los casos de Sida, es decir, los casos de aquellas personas con síntomas. A partir de ese momento se empezó a notificar todas las infecciones".

Las autoridades hacen un análisis diferenciado entre VIH Y Sida, porque una persona enferma sintomática infectada con VIH no necesariamente tiene Sida, sino cuando se produce un período en el sistema inmunológico, donde aparecen los llamados "eventos marcadores", por ejemplo neumonías a repetición, ahí se dice que la persona tiene Sida. Por eso la diferencia.

Las personas infectadas con el virus del VIH pueden desarrollar su vida con normalidad aplicándose la terapia retroviral de entrega gratuita por parte del programa público de los países. El Programa Sida tiene indicadores de gestión, éste busca facilitar el acceso al tratamiento pero también a los estudios que necesita la persona con VIH y a los insumos que se requieren para su diagnóstico.

En cuanto a la mortalidad la experta del ministerio reconoció que hay un retraso en la notificación por muerte, por lo tanto las cifras son estimaciones.

LO QUE DEBES SABER DEL VHI
El virus de la inmunodeficiencia humana, HIV o VIH
Es ADQUIRIDA, no es hereditaria, sino causada por un virus
Ataca el sistema inmunitario del organismo
Debilita las defensas contra la enfermedad
Hace que el organismo sea vulnerable a una serie de infecciones y cánceres que, potencialmente, ponen en peligro la vida
El VIH es infeccioso, lo que significa que puede transmitirse de una persona a otra
El VIH se encuentra en todos los líquidos orgánicos de aquella persona que tiene el virus: sangre, semen, saliva, lágrimas, leche, calostro, orina, secreciones uterinas y vaginales y el líquido preseminal. El semen, fluidos vaginales y la leche materna presentan una concentración suficiente como para producir la transmisión
Se llama persona con VIH a la persona en la que se detecta que ha tenido contacto con el virus. Enfermo/a es la persona en la cual se han detectado enfermedades causadas por la inmunodeficiencia producida por el virus. La persona que vive con el virus no tiene síntomas
El análisis de VIH-SIDA es la única manera de saber si tienes el virus. Es voluntario, gratuito y confidencial en Iberoamérica

El VIH y el SIDA en el mundo

Las últimas estadísticas de la epidemia mundial de SIDA y VIH fueron publicadas por ONUSIDA/OMS en 2010, y se refieren al final de 2009.

	Cálculo estimativo	**Rango**
Personas que viven con VIH/SIDA en 2009	33,3 millones	31,4-35,3 millones
Adultos que viven con VIH/SIDA en 2009	30,8 millones	29,2-32,6 millones
Mujeres que viven con VIH/SIDA en 2009	15,9 millones	14,8-17,2 millones
Niños que viven con VIH/SIDA en 2009	2,5 millones	1,6-3,4 millones
Personas recientemente infectadas con VIH en 2009	2,6 millones	2,3-2,8 millones
Muertes por SIDA en 2009	1,8 millones	1,6-2,1 millones

Estadísticas regionales de VIH y SIDA

Región	Adultos y niños que viven con VIH/SIDA	Adultos y niños recientemente infectados	Frecuencia en Adultos*	Muertes de adultos y niños
Central y América del Sur	1,4 millones	92 000	0,5%	58 000
América del Norte	1,5 millones	70 000	0,5%	26 000

El VIH en Argentina

- 130 mil personas infectadas con el virus del VIH. La mitad de ellos conoce su condición y la mayoría se encuentra en seguimiento en los servicios de salud.
- Cada mil adultos, 4 viven con VIH (prevalencia del 0,4%).
- La prevalencia entre varones que tienen sexo con varones es del 12%, la de trabajadoras/es sexuales es del 5%, la de usuarios de drogas llega al 7% y la de mujeres transexuales al 34%.
- En el país se distribuyen anualmente 45 millones de preservativos gratuitos. Y existen 2.533 centros de distribución donde conseguirlos.
- 43 mil personas reciben tratamiento ARV gratuito (69% provisto por el Estado).
- Actualmente, 1.400 personas mueren por sida en un año.
- Por año, se detectan 5.500 nuevos diagnósticos
- 1,7 varones por cada mujer diagnosticada.
- El promedio de edad es de 36 años en varones y de 32 años en mujeres.
- El 20% tienen más de 45 años.
- El 85% de los varones y el 88% de las mujeres se infectaron por vía sexual.

Fuente: www.msal.gov.ar/sida

Notas

* Los adultos se definen como hombres y mujeres de más de 15 años, a menos que se especifique lo contrario.

Niños huérfanos por el SIDA se definen a las personas de menos de 18 años que están vivos y que han perdido a uno o ambos padres por el SIDA.

Todas las estadísticas de esta página deben ser interpretadas con cautela debido a que son cálculos estimativos.

Infórmate:

http://unworkplace.unaids.org/espanol/pages/basics/what_is_hiv.shtml#E

http://www.msal.gov.ar/

Fundación Huésped, Argentina: http://www.huesped.org.ar/

Teléfono por consultas: 0800 222 HUESPED (4837), info@huesped.org.ar